

PROSPECTO

Núcleo C.M.P. Forte cápsulas

COMPOSICIÓN

Por cápsula:

Citidín-5'-monofosfato disódico (CMP sal disódica) 5 mg.

Uridín-5'-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica)

Uridín-5'-difosfato disódico (UDP sal disódica)

Uridín-5'-monofosfato disódico (UMP sal disódica)

en total 3 mg (equivalentes a 1,330 mg de Uridina).

Excipientes: Acido cítrico, Citrato sódico 2H₂O, Aerosil 200, Estearato magnésico y Manitol, c.s.

La cápsula contiene: Gelatina, Bióxido de titanio, Indigotina y Óxido de hierro.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Envase con 30 cápsulas.

ACTIVIDAD

Núcleo CMP Forte aporta los grupos fosfato necesarios en la unión de los monosacáridos con las ceramidas, para formar cerebrósidos y ácidos fosfatídicos que constituyen la esfingomielina y glicerofosfolípidos, componentes principales de la vaina de mielina, con lo que se consiguen unas mayores propiedades tróficas para la maduración y regeneración axonal del tejido nervioso.

TITULAR Y FABRICANTE

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94. 08028 Barcelona (España). Dir. Técnico: Dr. F. Taxonera Roca.

INDICACIONES

Tratamiento de las neuropatías de origen osteoarticular (ciática, radiculitis, etc.), metabólico (polineuritis diabética, alcohólica, etc.), infeccioso (herpes zóster) y a frigore. Neuralgia del Facial, Trigémino, Intercostal, Lumbago.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen. A menos de que exista una alergia a cualquiera de los componentes.

INTERACCIONES

No se conocen.

POSOLOGÍA

Núcleo CMP Forte cápsulas se administra por vía oral.

Adultos: 1 cápsula cada 8 horas.

Niños: 1 cápsula 2 veces al día.

Según criterio médico.

SOBREDOSIS

Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la intoxicación ni aún la accidental.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Texto revisado: Junio 1993

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.