

Prospecto

Mitosyl

COMPOSICIÓN

Cada 100 gramos de pomada contienen: Aceite de hígado de bacalao (estandarizado) 0,5 g (conteniendo 25.000 U.I. de Vitamina A y 2000 U.I. de Vitamina D), Óxido de zinc 27 g, Excipientes : Salicilato de metilo, Lanolina, Vaselina Filante, Vaselina Líquida, Butilhidroxianisol, Esencia de geranio, Agua purificada c.s.p. 100 g.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Pomada, envase conteniendo 65 g.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona

Fabricante:

Sanofi Winthrop Industrie
Amilly (Francia)

ACTIVIDAD

Los componentes de MITOSYL son aceite de hígado de bacalao, rico en Vitaminas A y D, y óxido de zinc, con propiedades absorbentes y astringentes, por lo que presenta una acción protectora y suavizante de la piel en rozaduras y escoceduras (como es el caso del pañal).

MITOSYL contiene como excipientes vaselina y lanolina, base especialmente estudiada para formar una barrera protectora frente a agresiones externas.

INDICACIONES

MITOSYL es una pomada indicada en el alivio local sintomático de las lesiones de la piel producidas por irritaciones, grietas, rozaduras, quemaduras leves y escoceduras.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Piel acnéica y grasas.

PRECAUCIONES

Si los síntomas se agravan o persisten más de 10 días de tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico. Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con ojos y oídos. En caso de infección o quemaduras graves, acudir al médico.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia: No son necesarias advertencias especiales.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: No se han descrito.

Advertencia sobre excipientes:

Por contener Butilhidroxianisol (E-320) puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas.

Por contener Lanolina (o grasa de lana) puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).

POSOLOGÍA

Uso externo sobre la piel. Limpiar y secar la zona. Desinfectar en caso necesario. Aplicar una capa de pomada sobre la zona afectada, repitiendo dicha aplicación 1 ó 2 veces al día o como le indique su médico.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Retirar el precinto antes de la primera utilización.

SOBREDOSIS

Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En casos de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un Centro Médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones alérgicas locales o generales (picor, hinchazón y erupciones generalizadas). Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa atribuible a la aplicación del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30°C.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

TEXTO REVISADO

Febrero 2008

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona